

Процедура разблаживања Esmeron-a 50 mg/5ml

Верзија	Датум	Ознака форме процедуре	Деловодни број	Израдио/ла	Одобрио/ла
1	18. 12. 2018.	ПХ 31		МС Диана Мрвош	ВСС Љиљана Томић, Проф. др Душица Симић Комисија за доношење и усвајање процедура

Верзија	Датум	Разлог измене	Израдио/ла	Одобрио/ла
			Директор Доц. др Синиша Дучић МП	

1. СВРХА

Овом процедуром се дефинише поступак правилног и сигурног навлачења и разблаживања Esmeron-a 50 mg/5ml за интравенску примену.

2. ОБИМ ПРИМЕНЕ И ПОЉЕ ПРИМЕНЕ

Документ обухвата поступак навлачења и разблаживања лека у редовним и хитним ситуацијама ординирања истог.

Поље примене: Обавезујући за све је МС-Т/АТ који пружају терпију Esmeron-ом 50 mg/5ml.

3. ОДГОВОРНОСТИ

За извођење процедуре и асептичне услове приликом извођења исте одговорна је МС-Т/АТ.

4. СПИСАК СКРАЋЕНИЦА

УДК	Универзитетска дечја клиника
МС-Т/АТ	Медицинска сестра- техничар/анестетичар
ТМ	Телесна маса

5. ДЕФИНИЦИЈЕ

Разблаживање лека се врши додавањем одређене запремине растварача (Natrii chloridi 0.9% 9g/l раствор за инфузију).

Процедура разблаживања Esmeron-a 50 mg/5ml изводи се ради што прецизније апликације жељене дозе лека.

6. ДЕТАЉАН ОПИС ПРОЦЕДУРЕ (ИЛИ ДЕТАЉАН ОПИС ПРОЦЕСА, ПОСТУПКА)

Навлачење и разблаживање лека спроводи МС-Т/АТ која ће вршити и апликацију лека. Навлачење и разблаживање обавља се под асептичним условима.

У оквиру припреме лека потребно је предузети следеће мере сигурности:

- проверити исправност рока употребе лека,
- проверити исправност паковања лека,
- проверити назив и дозу лека,
- проверити исправност рока употребе растварача,
- проверити исправност паковања растварача,
- проверити назив и дозу растварача.

6.1. Припрема прибора и материјала

радни простор и површине за извођење поступка морају бити чисте и уредне,

- колича,
- одговарајући лек (Esmeron 50mg/5ml),

- одговарајући растварач (Natrii chloridi 0.9% 9g/l),
- mini spike,
- средство за дезинфекцију,
- игле и шприцеви потребне величине (5ml, 10ml),
- тупфери од газе,
- посуда за нечисто,
- контејнер за одлагање оштрих предмета,
- рукавице.

6.2. Извођење поступка навлачења Esmeron-a 50 mg/5ml:

- Опрати или дезинфиковати и посушити руке, навући рукавице,
- Одстранити пластични поклопац с бочице Esmeron-a 50 mg/5ml,
- Дезинфиковати чеп бочице Esmeron 50 mg/5ml тупфером натопљеном дезинфекционим средством,
- Отпаковати шприц од 5ml и заштитити иглом,
- Скинути заштиту са игле, истом пунктирати бочицу и навући лек,
- Употребљену иглу одложити у контејнер за одлагање оштрих предмета,
- Ставити нову стерилну иглу са штитником на шприц,
- Шприц обележити **црвеном** бојом: - назив лека (Esmeron),
 - концентрација лека (10mg/1ml),
 - датум и време отварања лека.

6.3. Извођење поступка разблаживања Esmeron-a 50 mg/5ml:

- Опрати или дезинфиковати и посушити руке, навући рукавице,
- Одстранити алуминијумски или пластични поклопац с боце Natrii chloridi 0.9% 9g/L,
- Дезинфиковати чеп боце Natrii chloridi 0.9% 9g/l тупфером натопљеном дезинфекционим средством,
- Боцу пунктирати mini spike-ом,
- У шприц од 10ml навући 5ml Natrii chloridi 0.9% 9g/l,
- Шприц деконектовати и, mini spike затворити,
- У шприц са 5ml Natrii chloridi 0.9% 9g/L, навући 5ml Esmeron-a 50 mg/5ml,
- Ставити нову стерилну иглу са штитником на шприц,
- Шприц обележити **црвеном** бојом: - назив лека (Esmeron),
 - концентрација лека (5mg/1ml),
 - датум и време отварања лека.

6.4. Извођење поступка разблаживања Esmeron-a 50 mg/5ml за пацијенте чија је ТМ<10kg:

- Опрати или дезинфиковати и посушити руке, навући рукавице,
- Одстранити алуминијумски или пластични поклопац с боце Natrii chloridi 0.9% 9g/l,

- Дезинфиковати чеп боце Natrii chloridi 0.9% 9g/l тупфером натопљеном дезинфекционим средством,
- Боцу пункцирати mini spike-ом,
- У шприц од 10ml навући 8ml Natrii chloridi 0.9% 9g/l,
- Шприц деконектовати и, mini spike затворити,
- У шприц са 8ml Natrii chloridi 0.9% 9g/l убризгати 2ml раствора Esmeron-a 50 mg/5ml,
- Ставити нову стерилну иглу са штитником на шприц,
- Шприц обележити **црвеном** бојом: - назив лека (Esmeron),
 - концентрација лека (2mg /1ml),
 - датум и време отварања лека.

Сву неискоришћену количину лека или отпадног материјала након његове употребе треба уклонити у складу са важећим прописима.

7. ДОКАЗИ

/

8. РЕФЕРЕНЦЕ

/