

Процедура разблаживања Midarine 100mg/2ml

Верзија	Датум	Ознака форме процедуре	Деловодни број	Израдио/ла	Одобрио/ла
1	18.12.20 18.	ПХ 35		МС Диана Мрвош	ВСС Љиљана Томић, Проф. др Душица Симић Комисија за доношење и усвајање процедура

Верзија	Датум	Разлог измене	Израдио/ла	Одобрио/ла
			Директор доц. др Синиша Дучић МП	

1. СВРХА

Овом процедуром се дефинише поступак правилног и сигурног навлачења и разблаживања Midarine 100mg/2ml за интравенску примену.

2. ОБИМ ПРИМЕНЕ И ПОЉЕ ПРИМЕНЕ

Документ обухвата поступак навлачења и разблаживања лека у редовним и хитним ситуацијама ординирања истог.

Поље примене: Обавезујући за све је МС-Т/АТ који пружају терпију Midarine 100mg/2ml.

3. ОДГОВОРНОСТИ

За извођење процедуре и асептичне услове приликом извођења исте одговорна је МС-Т/АТ.

4. СПИСАК СКРАЋЕНИЦА

УДК	Универзитетска дечја клиника
МС-Т/АТ	Медицинска сестра- техничар/анестетичар
ТМ	Телесна маса

5. ДЕФИНИЦИЈЕ

Разблаживање лека се врши додавањем одређене запремине растварача Natrii chloridi 0.9% 9g/l раствор за инфузију).

Процедура разблаживања Midarine 100mg/2ml изводи се ради што прецизније апликације жељене дозе лека.

6. ДЕТАЉАН ОПИС ПРОЦЕДУРЕ (ИЛИ ДЕТАЉАН ОПИС ПРОЦЕСА, ПОСТУПКА)

Разблаживање лека спроводи МС-Т/АТ која ће вршити и апликацију лека. Навлачење и разблаживање обавља се под асептичним условима.

У оквиру припреме лека потребно је предузети следеће мере сигурности:

- проверити исправност рока употребе лека,
- проверити исправност паковања лека,
- проверити назив и дозу лека,
- проверити исправност рока употребе растварача,
- проверити исправност паковања растварача,
- проверити назив и дозу растварача.

6.1. Припрема прибора и материјала

радни простор и површине за извођење поступка морају бити чисте и уредне,

- колица,
- одговарајући лек (Midarine 100mg/2ml),
- одговарајући растварач (Natrii chloridi 0.9% 9g/l),
- mini spike,
- средство за дезинфекцију,
- игле и шприц потребне величине (10ml),

- тупфери од газе,
- посуда за нечисто,
- контејнер за одлагање оштрих предмета,
- рукавице.

6.2.Извођење поступка разблаживања Midarine 100mg/2ml:

- Опрати или дезинфиковати и посушити руке, навући рукавице,
- Одстранити алуминијумски или пластични поклопац с боце Natrii chloridi 0.9% 9g/l,
- Дезинфиковати чеп боце тупфером натопљеном дезинфекционим средством,
- Боцу пункцирати mini spike-ом,
- У шприц навући 8ml Natrii chloridi 0.9% 9g/l,
- Шприц деконектовати и заштитити иглом, Mini spike затворити,
- Из горњег дела ампуле Midarine 100mg/2ml полукружним покретом спустити лек у доњи део ампуле,
- Одломити врат ампуле према ознаци на врату ампуле,
- Скинути заштиту са игле, исту убацити до дна ампуле и навући лек,
- Не извлачећи иглу из ампуле, окренути шприц и истиснути мехуриће ваздуха у ампулу пазећи да се не истискује лек,
- Употребљену иглу одложити у контејнер за одлагање оштрих предмета,
- Ставити нову стерилну иглу са штитником на шприц,
- Шприц обележити црвеном бојом: - назив лека (Midarine),
 - концентрација лека (10mg/1ml),
 - датум и време отварања лека.

6.3. Извођење поступка разблаживања Midarine 100mg/2ml за пацијенте чија је ТМ<10kg:

- Опрати или дезинфиковати и посушити руке, навући рукавице,
- Одстранити алуминијумски или пластични поклопац с боце Natrii chloridi 0.9% 9g/l,
- Дезинфиковати чеп боце Natrii chloridi 0.9% 9g/l тупфером натопљеном дезинфекционим средством
- Боцу пункцирати mini spike-ом,
- У шприц од 10ml навући 8ml Natrii chloridi 0.9% 9g/l,
- Шприц деконектовати и, mini spike затворити,
- У шприц са 8ml Natrii chloridi 0.9% 9g/l убризгати 2ml разблажења Midarine 10mg/1ml,
- Ставити стерилну иглу са штитником на шприц,
- Шприц обележити црвеном бојом: - назив лека (Midarine),
 - концентрација лека (2mg/1ml),
 - датум и време отварања лека.

Рок употребе након првог отварања/разблажења: раствор се мора употребити одмах.

Сву неискоришћену количину лека или отпадног материјала након његове употребе треба уклонити у складу са важећим прописима.

7. ДОКАЗИ

/

8. РЕФЕРЕНЦЕ

/